

## 产品使用说明书 Product Manual

### MS 培养基基盐(含 $1/2\text{NH}_4\text{NO}_3$ 和 $\text{KNO}_3$ , 含维生素)

品牌	Chinook 钦诺克	
货号	CN260517	
中文名称	MS 培养基基盐(含 $1/2\text{NH}_4\text{NO}_3$ 和 $\text{KNO}_3$ , 含维生素)	
英文名称	MS Base Salts ( $1/2\text{NH}_4\text{NO}_3$ & $\text{KNO}_3$ , With Vitamins)	
产品别名	MS 培养基(含 $1/2\text{NH}_4\text{NO}_3$ 和 $\text{KNO}_3$ , 含维生素)	
用途	用于植物组织培养	
<b>成分 (mg/L) :</b>		
硝酸铵 $\text{NH}_4\text{NO}_3$		825.0
氯化钙 $\text{CaCl}_2$		332.2
硫酸镁 $\text{MgSO}_4$		180.7
硝酸钾 $\text{KNO}_3$		950.0
磷酸二氢钾 $\text{KH}_2\text{PO}_4$		170.0
硼酸 $\text{H}_3\text{BO}_3$		6.2
六水氯化钴 $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$		0.025
五水硫酸铜 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$		0.025
乙二胺四乙酸铁钠 FeNaEDTA		36.7
一水硫酸锰 $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$		16.9
二水钼酸钠 $\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$		0.25
碘化钾 KI		0.83
七水硫酸锌 $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$		8.6
甘氨酸 Glycine		2.0
肌醇 Myo-Inositol		100.0
烟酸 Nicotinic Acid		0.5
盐酸吡哆醇 Pyridoxine HCL		0.5
盐酸硫胺素 Thiamine HCL		0.1
<b>用法:</b>		
称取本品 2.63g (精确值 2.63053g), 加入 1000mL 蒸馏水中溶解, 根据实验所需添加蔗糖和琼脂等成分 (若添加琼脂则需加热煮沸搅拌至溶解), 调节 pH 值 (一般为 $\text{pH}5.8 \pm 0.2$ ), 分装, $121^\circ\text{C}$ 高压灭菌 15 分钟。		



**注意：**如需添加植物激素，耐高温的植物激素如 IBA、NAA 、6-BA 和 2,4-D，可提前加入一起高压灭菌，其他不耐高温的植物激素，需单独溶解并过滤除菌，待培养基冷却至 65°C 左右时加入。

### **储存方式：**

常温运输，2-8°C 密封储存；保质期 3 年。

### **注意事项：**

1. MS 培养基，需自行调解 pH 值时，可自行使用盐酸和氢氧化钠调解 pH，一般调为 pH5.8±0.2。
2. MS 培养基，需要自行添加蔗糖的配方，蔗糖添加量一般为 20.0-30.0g/L；需自行添加凝胶的配方，琼脂粉添加量一般为 7.0-12.0g/L，植物凝胶添加量一般为 2.0-4.0g/L。
3. 含蔗糖的植物组织培养基，高压灭菌时，需要注意避免产生糖焦化现象，以 121°C 高压灭菌 15 分钟或 115°C 高压灭菌 20 分钟为宜。
4. 含琼脂或植物凝胶的培养基，高压灭菌前一定要加热煮沸，搅拌至完全溶解，煮沸后搅拌时间约 1 分钟。注意：切不可省掉加热煮沸搅拌溶解的步骤直接高压灭菌。
5. 添加植物激素，耐高温的植物激素如 IBA、NAA 、6-BA 和 2,4-D，可提前加入一起高压灭菌；对于其他不耐高温的植物激素，一般需先单独溶解成高倍母液并过滤除菌，待培养基冷却至 65°C 左右时加入。
6. 该产品不适宜制备高浓度母液，会有沉淀产生。
7. 称量时注意粉尘，佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。
8. 干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖，避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处。未开封产品保质期三年。开封后根据存放条件的不同，保质时间存在一定的差异。

### **废物处理：**

检测之后带菌物品置于 121°C 下高压灭菌 30 分钟后处理。