

产品使用说明书 Product Manual

缺铁缺锰缺锌 1/2MS 培养基基盐 (不含维生素)

品牌	Chinook 钦诺克	
货号	CN263515	
中文名称	缺铁缺锰缺锌 1/2MS 培养基基盐 (不含维生素)	
英文名称	1/2 MS Base Salts(-Fe-Mn-Zn, Without Vitamins)	
产品别名	缺铁缺锰缺锌 1/2MS 培养基 (不含维生素)	
用途	用于植物组织培养	
成分 (mg/L) :		
硝酸铵 NH_4NO_3		825.0
氯化钙 CaCl_2		166.1
硫酸镁 MgSO_4		90.35
硝酸钾 KNO_3		950.0
磷酸二氢钾 KH_2PO_4		85.0
硼酸 H_3BO_3		6.2
五水硫酸铜 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$		0.025
二水钼酸钠 $\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$		0.25
碘化钾 KI		0.83
六水氯化钴 $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$		0.025
用法:		
<p>称取本品 2.12g (精确值 2.12378g), 加入 1000mL 蒸馏水中溶解, 根据实验所需添加维生素、蔗糖和琼脂等成分 (若添加琼脂则需加热煮沸搅拌至溶解), 调节 pH 值 (一般为 $\text{pH}5.8 \pm 0.2$), 分装, 121°C 高压灭菌 15 分钟。</p> <p>注意: 如需添加植物激素, 耐高温的植物激素如 IBA、NAA、6-BA 和 2,4-D, 可提前加入一起高压灭菌, 其他不耐高温的植物激素, 需单独溶解并过滤除菌, 待培养基冷却至 65°C 左右时加入。</p>		
储存方式:		
常温运输, $2-8^\circ\text{C}$ 密封储存; 保质期 3 年。		
注意事项:		

1. MS 培养基，需自行调解 pH 值时，可自行使用盐酸和氢氧化钠调解 pH，一般调为 $pH5.8 \pm 0.2$ 。
2. MS 培养基，需要自行添加蔗糖的配方，蔗糖添加量一般为 20.0-30.0g/L；需自行添加凝胶的配方，琼脂粉添加量一般为 7.0-12.0g/L，植物凝胶添加量一般为 2.0-4.0g/L。
3. 含蔗糖的植物组织培养基，高压灭菌时，需要注意避免产生糖焦化现象，以 121°C 高压灭菌 15 分钟或 115°C 高压灭菌 20 分钟为宜。
4. 含琼脂或植物凝胶的培养基，高压灭菌前一定要加热煮沸，搅拌至完全溶解，煮沸后搅拌时间约 1 分钟。注意：切不可省掉加热煮沸搅拌溶解的步骤直接高压灭菌。
5. 添加植物激素，耐高温的植物激素如 IBA、NAA、6-BA 和 2,4-D，可提前加入一起高压灭菌；对于其他不耐高温的植物激素，一般需先单独溶解成高倍母液并过滤除菌，待培养基冷却至 65°C 左右时加入。
6. 该产品不适宜制备高浓度母液，会有沉淀产生。
7. 称量时注意粉尘，佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。
8. 干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖，避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处。未开封产品保质期三年。开封后根据存放条件的不同，保质时间存在一定的差异。

废物处理：

检测之后带菌物品置于 121°C 下高压灭菌 30 分钟后处理。