

## 产品使用说明书 Product Manual

### 缺氮缺磷缺钾 1/2MS 培养基基盐 (不含维生素)

品牌	Chinook 钦诺克
货号	CN263513
中文名称	缺氮缺磷缺钾 1/2MS 培养基基盐 (不含维生素)
英文名称	1/2 MS Base Salts(-N-P-K,Without Vitamins)
产品别名	缺氮缺磷缺钾 1/2MS 培养基 (不含维生素)
用途	用于植物组织培养
<b>成分 (mg/L) :</b>	
氯化钙 CaCl <sub>2</sub>	166.1
硫酸镁 MgSO <sub>4</sub>	90.35
硼酸 H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub>	6.2
六水氯化钴 CoCl <sub>2</sub> ·6H <sub>2</sub> O	0.025
五水硫酸铜 CuSO <sub>4</sub> ·5H <sub>2</sub> O	0.025
乙二胺四乙酸铁钠 FeNaEDTA	36.7
一水硫酸锰 MnSO <sub>4</sub> ·H <sub>2</sub> O	16.9
二水钼酸钠 Na <sub>2</sub> MoO <sub>4</sub> ·2H <sub>2</sub> O	0.25
碘化钾 KI	0.83
七水硫酸锌 ZnSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O	8.6
<b>用法:</b>	
称取本品 0.33g (精确值 0.32598g), 加入 1000mL 蒸馏水中溶解, 根据实验所需添加维生素、蔗糖和琼脂等成分 (若添加琼脂则需加热煮沸搅拌至溶解), 调节 pH 值 (一般为 pH5.8±0.2), 分装, 121°C 高压灭菌 15 分钟。	
<b>注意:</b> 如需添加植物激素, 耐高温的植物激素如 IBA、NAA、6-BA 和 2,4-D, 可提前加入一起高压灭菌, 其他不耐高温的植物激素, 需单独溶解并过滤除菌, 待培养基冷却至 65°C 左右时加入。	
<b>储存方式:</b>	
常温运输, 2-8°C 密封储存; 保质期 3 年。	
<b>注意事项:</b>	

1. MS 培养基，需自行调解 pH 值时，可自行使用盐酸和氢氧化钠调解 pH，一般调为  $pH5.8\pm0.2$ 。
2. MS 培养基，需要自行添加蔗糖的配方，蔗糖添加量一般为 20.0-30.0g/L；需自行添加凝胶的配方，琼脂粉添加量一般为 7.0-12.0g/L，植物凝胶添加量一般为 2.0-4.0g/L。
3. 含蔗糖的植物组织培养基，高压灭菌时，需要注意避免产生糖焦化现象，以 121°C 高压灭菌 15 分钟或 115°C 高压灭菌 20 分钟为宜。
4. 含琼脂或植物凝胶的培养基，高压灭菌前一定要加热煮沸，搅拌至完全溶解，煮沸后搅拌时间约 1 分钟。注意：切不可省掉加热煮沸搅拌溶解的步骤直接高压灭菌。
5. 添加植物激素，耐高温的植物激素如 IBA、NAA、6-BA 和 2,4-D，可提前加入一起高压灭菌；对于其他不耐高温的植物激素，一般需先单独溶解成高倍母液并过滤除菌，待培养基冷却至 65°C 左右时加入。
6. 该产品不适宜制备高浓度母液，会有沉淀产生。
7. 称量时注意粉尘，佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。
8. 干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖，避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处。未开封产品保质期三年。开封后根据存放条件的不同，保质时间存在一定的差异。

### **废物处理：**

检测之后带菌物品置于 121°C 下高压灭菌 30 分钟后处理。