

产品使用说明书

Product Manual

500×荷兰花卉研究所岩棉滴灌用玫瑰营养液(3种母液)

品牌	Chinook 钦诺克
货号	CN270144
中文名称	500×荷兰花卉研究所岩棉滴灌用玫瑰营养液(3种母液)
英文名称	500×Rose Nutrient Solution For Drip Irrigation By Holland Flower Research Institute
产品别名	荷兰花卉研究所岩棉滴灌用玫瑰营养液(溶液)、荷兰花卉研究所, 岩棉滴灌
用途	用于玫瑰营养研究与无土栽培
配方出处	郭世荣 孙锦. 2018. 无土栽培学 (第三版). 北京: 中国农业出版社

工作液浓度 (mg/L) :

四水硝酸钙 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	786.0
硝酸钾 KNO_3	341.0
硝酸铵 NH_4NO_3	20.0
磷酸二氢钾 KH_2PO_4	204.0
七水硫酸镁 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	185.0
乙二胺四乙酸铁钠 FeNaEDTA	36.7
硼酸 H_3BO_3	2.86
四水硫酸锰 $\text{MnSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	2.13
七水硫酸锌 $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	0.22
五水硫酸铜 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	0.08
四水钼酸铵 $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	0.02
pH	5.5~6.5(25°C)

母液浓度 (g/L) :

母液 A: 500×荷兰花卉研究所岩棉滴灌用玫瑰大量元素 A 溶液 (g/L) :

四水硝酸钙 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	393.0
硝酸钾 KNO_3	170.5
硝酸铵 NH_4NO_3	10.0
蒸馏水 Distilled Water	1000mL
pH	5.5~6.5(25°C)

母液 B: 500×荷兰花卉研究所岩棉滴灌用玫瑰大量元素 B 溶液 (g/L) :		
磷酸二氢钾 KH_2PO_4	102.0	
七水硫酸镁 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	92.5	
蒸馏水 Distilled Water	1000mL	
pH	5.5~6.5(25°C)	
母液 C: 500×荷兰花卉研究所岩棉滴灌用玫瑰微量元素溶液 (g/L) :		
乙二胺四乙酸铁钠 FeNaEDTA	18.35	
硼酸 H_3BO_3	1.43	
四水硫酸锰 $\text{MnSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	1.065	
七水硫酸锌 $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	0.11	
五水硫酸铜 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	0.04	
四水钼酸铵 $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	0.01	
蒸馏水 Distilled Water	1000mL	
pH	5.5~6.5(25°C)	
产品组成:		
产品组成	250mL	500mL
母液 A: 500×荷兰花卉研究所岩棉滴灌用玫瑰大量元素 A 溶液	250mL	500mL
母液 B: 500×荷兰花卉研究所岩棉滴灌用玫瑰大量元素 B 溶液	250mL	500mL
母液 C: 500×荷兰花卉研究所岩棉滴灌用玫瑰微量元素溶液	250mL	500mL
规格说明:	500×荷兰花卉研究所岩棉滴灌用玫瑰营养液, 为三组分浓缩液形式, 250mL/500mL 规格分别可以配置 125L/250L 的 1×工作浓度的荷兰花卉研究所岩棉滴灌用玫瑰营养液。	
使用方法:		
1. 配置 1L 工作液: 分别量取母液 A、母液 B、母液 C, 各 2mL, 滴入 994mL 水中, 混匀, 根据实验需求调节 pH 值, 适宜 pH 范围为 5.5~6.5, 即得荷兰花卉研究所岩棉滴灌用玫瑰营养液 1L。		
2. 配制其它体积工作液, 按比例加入混匀即可。		
储存方式:		
常温运输; 2-8°C 保存, 保质期 12 个月。		



相关产品:

CN260932 500×荷兰花卉研究所岩棉滴灌用玫瑰营养液(3种母液,干粉)与CN270144 500×荷兰花卉研究所岩棉滴灌用玫瑰营养液(3种母液),营养成分完全相同,不同之处在于:前者,为粉末形式;后者,为液体形式。

注意事项:

1. 本品若作为复合肥使用,可以采用天然水配制;若作为无土栽培营养液需用人工软水配制,如蒸馏水。
2. 本品配置时,需要根据需求来调节 pH 值。适宜 pH 范围为 5.5~6.5,但具体数值可能因不同的研究和应用场景而略有差异。
3. 影响植物生长的因素有很多,如光照、温度、湿度、病虫害等,实验前请充分考虑环境因素。
4. 打开包装的产品务必及时配制工作液,配制好的工作液只能短期常温储存。
5. 高倍母液低温会有析出,完全溶解后再配制工作液。
6. 营养液缓冲体系较小,用水偏酸或偏碱都会对营养液造成影响。

废物处理:

检测之后带菌物品置于 121°C 下高压灭菌 30 分钟后处理。