

产品使用说明书 Product Manual

500×华南农业大学叶菜 A 营养液(3 种母液)

品牌	Chinook 钦诺克	
货号	CN270125	
中文名称	500×华南农业大学叶菜 A 营养液(3 种母液)	
英文名称	500×Leafy Vegetable A Nutrient Solution By SCAU	
产品别名	华南农业大学叶菜 A 营养液(溶液)	
用途	用于普通叶菜营养研究与无土栽培	
配方出处	郭世荣 孙锦. 2018. 无土栽培学 (第三版). 北京: 中国农业出版社	
工作液浓度 (mg/L) :		
四水硝酸钙 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	472.0	
硝酸钾 KNO_3	267.0	
硝酸铵 NH_4NO_3	53.0	
磷酸二氢钾 KH_2PO_4	100.0	
硫酸钾 K_2SO_4	116.0	
七水硫酸镁 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	264.0	
乙二胺四乙酸铁钠 FeNaEDTA	36.7	
硼酸 H_3BO_3	2.86	
四水硫酸锰 $\text{MnSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	2.13	
七水硫酸锌 $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	0.22	
五水硫酸铜 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	0.08	
四水钼酸铵 $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	0.02	
pH	6.4~7.2(25°C)	
母液浓度 (g/L) :		
母液 A: 500×华南农业大学叶菜 A 大量元素 A 溶液 (g/L) :		
四水硝酸钙 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	236.0	
硝酸钾 KNO_3	133.5	
硝酸铵 NH_4NO_3	26.5	
蒸馏水 Distilled Water	1000mL	
pH	6.4~7.2(25°C)	

母液 B: 500×华南农业大学叶菜 A 大量元素 B 溶液 (g/L) :

磷酸二氢钾 KH_2PO_4	50.0
硫酸钾 K_2SO_4	58.0
七水硫酸镁 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	132.0
蒸馏水 Distilled Water	1000mL
pH	6.4~7.2(25°C)

母液 C: 500×华南农业大学叶菜 A 微量元素溶液 (g/L) :

乙二胺四乙酸铁钠 FeNaEDTA	18.35
硼酸 H_3BO_3	1.43
四水硫酸锰 $\text{MnSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	1.065
七水硫酸锌 $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	0.11
五水硫酸铜 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	0.04
四水钼酸铵 $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	0.01
蒸馏水 Distilled Water	1000mL
pH	6.4~7.2(25°C)

产品组成:

产品组成	250mL	500mL
母液 A: 500×华南农业大学叶菜 A 大量元素 A 溶液	250mL	500mL
母液 B: 500×华南农业大学叶菜 A 大量元素 B 溶液	250mL	500mL
母液 C: 500×华南农业大学叶菜 A 微量元素溶液	250mL	500mL

规格说明:

500×华南农业大学叶菜 A 营养液, 为三组分浓缩液形式, 250mL/500mL 规格分别可以配置 125L/250L 的 1×工作浓度的华南农业大学叶菜 A 营养液。

使用方法:

1. 配置 1L 工作液: 分别量取母液 A、母液 B、母液 C, 各 2mL, 滴入 994mL 水中, 混匀, 根据实验需求调节 pH 值, 适宜 pH 范围为 6.2~7.8, 即得华南农业大学叶菜 A 营养液 1L。
2. 配制其它体积工作液, 按比例加入混匀即可。



储存方式:

常温运输; 2-8°C保存, 保质期 12 个月。

相关产品:

CN260913 500×华南农业大学叶菜 A 营养液(3 种母液,干粉)与 CN270125 500×华南农业大学叶菜 A 营养液(3 种母液), 营养成分完全相同, 不同之处在于: 前者, 为粉末形式; 后者, 为液体形式。

注意事项:

1. 本品若作为复合肥使用, 可以采用天然水配制; 若作为无土栽培营养液需用人工软水配制, 如蒸馏水。
2. 本品配置时, 需要根据需求来调节 pH 值。适宜 pH 范围为 6.4~7.2, 但具体数值可能因不同的研究和应用场景而略有差异。
3. 影响植物生长的因素有很多, 如光照、温度、湿度、病虫害等, 实验前请充分考虑环境因素。
4. 打开包装的产品务必及时配制工作液, 配制好的工作液只能短期常温储存。
5. 高倍母液低温会有析出, 完全溶解后再配制工作液。
6. 营养液缓冲体系较小, 用水偏酸或偏碱都会对营养液造成影响。

废物处理:

检测之后带菌物品置于 121°C下高压灭菌 30 分钟后处理。