

产品使用说明书

Product Manual

改良 MS 培养基 (含蔗糖, 不含维生素、琼脂) (pH5.8±0.2)

品牌	Chinook 钦诺克
货号	CN260424
中文名称	改良 MS 培养基 (含蔗糖, 不含维生素、琼脂) (pH5.8±0.2)
英文名称	Modified MS Medium (With Sucrose, Without Vitamins Or Agar)
产品别名	改良 MS 培养基 (不含维生素、琼脂) (pH5.8±0.2)
用途	用于植物组织培养

成分 (mg/L) :

硝酸铵 NH_4NO_3	1650.0
氯化钙 CaCl_2	332.2
硫酸镁 MgSO_4	180.7
硝酸钾 KNO_3	1900.0
磷酸二氢钾 KH_2PO_4	170.0
硼酸 H_3BO_3	6.2
六水氯化钴 $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	0.025
二水钼酸钠 $\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	0.25
碘化钾 KI	0.83
七水硫酸锌 $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	8.6
五水硫酸铜 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	0.025
乙二胺四乙酸铁钠 FeNaEDTA	36.7
一水硫酸锰 $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	16.9
蔗糖 Sucrose	30000.0
pH	5.8±0.2 (25°C)

用法:

称取本品 34.3g (精确值 34.30243g), 加入 1000mL 蒸馏水中溶解, 分装, 121°C 高压灭菌 15 分钟。

注意: 如需添加植物激素, 耐高温的植物激素如 IBA、NAA、6-BA 和 2,4-D, 可提前加入一起高压灭菌, 其他不耐高温的植物激素, 需单独溶解并过滤除菌, 待培养基冷却至 65°C 左右时加入。



储存方式:

常温运输, 2-8℃密封储存; 保质期 3 年。

注意事项:

1. 本品 5.8 ± 0.2 (25℃), 配置时可重新测量 pH 值, 如有必要可使用盐酸和氢氧化钠进行微调。
2. MS 培养基, 需要自行添加蔗糖的配方, 蔗糖添加量一般为 20.0-30.0g/L; 需自行添加凝胶的配方, 琼脂粉添加量一般为 7.0-12.0g/L, 植物凝胶添加量一般为 2.0-4.0g/L。
3. 含蔗糖的植物组织培养基, 高压灭菌时, 需要注意避免产生糖焦化现象, 以 121℃ 高压灭菌 15 分钟或 115℃ 高压灭菌 20 分钟为宜。
4. 含琼脂或植物凝胶的培养基, 高压灭菌前一定要加热煮沸, 搅拌至完全溶解, 煮沸后搅拌时间约 1 分钟。注意: 切不可省掉加热煮沸搅拌溶解的步骤直接高压灭菌。
5. 添加植物激素, 耐高温的植物激素如 IBA、NAA、6-BA 和 2,4-D, 可提前加入一起高压灭菌; 对于其他不耐高温的植物激素, 一般需先单独溶解成高倍母液并过滤除菌, 待培养基冷却至 65℃ 左右时加入。
6. 该产品不适宜制备高浓度母液, 会有沉淀产生。
7. 称量时注意粉尘, 佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。
8. 干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖, 避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处。未开封产品保质期三年。开封后根据存放条件的不同, 保质时间存在一定的差异。

废物处理:

检测之后带菌物品置于 121℃ 下高压灭菌 30 分钟后处理。