

产品使用说明书

Product Manual

MS 改良培养基(含 1 mg/L BA,0.1 mg/L NAA,蔗糖)

品牌	Chinook 钦诺克	
货号	CN263758	
中文名称	MS改良培养基(含1 mg/L BA,0.1 mg/L NAA,蔗糖)	
英文名称	Murashige & Skoog Modified Basal Medium	
产品别名	MS改良培养基(含1 mg/L BA,0.1 mg/L NAA,蔗糖)、 Murashige & Skoog Modified Basal Medium	
用途	用于植物组织培养	
成分 (mg/L) :		
硝酸铵 Ammonium Nitrate		1650
硼酸 Boric Acid		6.2
无水氯化钙 Calcium Chloride, Anhydrous		332.2
六水氯化钴 Cobalt Chloride•6H ₂ O		0.025
五水硫酸铜 Cupric Sulfate•5H ₂ O		0.025
乙二胺四乙酸二钠二水合物 Na ₂ EDTA•2H ₂ O		37.26
硫酸亚铁 Ferrous Sulfate		27.8
无水硫酸镁 Magnesium Sulfate, Anhydrous		180.7
一水硫酸锰 Manganese Sulfate•H ₂ O		16.9
钼酸钠二水合物 Molybdic Acid (Sodium Salt)•2H ₂ O		0.25
碘化钾 Potassium Iodide		0.83
硝酸钾 Potassium Nitrate		1900
磷酸二氢钾 Potassium Phosphate Monobasic		170
七水硫酸锌 Zinc Sulfate•7H ₂ O		8.6
6-苄氨基嘌呤 6-Benzylaminopurine (BA)		1.0
甘氨酸 Glycine		2
肌醇 myo-Inositol		100
α-萘乙酸 α-Naphthaleneacetic Acid		0.1
烟酸 Nicotinic Acid (Free Acid)		0.5
盐酸吡哆醇 Pyridoxine•HCl		0.5
蔗糖 Sucrose		30,000



盐酸硫胺素 Thiamine•HCl	0.4
用法:	
称取本品34.43g (精确值34.43489g) , 加入1000mL蒸馏水中溶解, 根据实验所需调节pH值 (一般为pH5.8±0.2) , 分装, 121℃高压灭菌15分钟。	
注意: 如需添加植物激素, 耐高温的植物激素如IBA、NAA 、6-BA和2,4-D, 可提前加入一起高压灭菌, 其他不耐高温的植物激素, 需单独溶解并过滤除菌, 待培养基冷却至65℃左右时加入。	
储存方式:	
常温运输, 2-8℃密封储存; 保质期3年。	
注意事项:	
1. 本品需自行调节pH值, 可自行使用盐酸和氢氧化钠调节pH, 一般调为pH5.8±0.2 (25℃) , 具体是实验需求而定。 2. MS培养基, 需要自行添加蔗糖的配方, 蔗糖添加量一般为20.0-30.0g/L; 需自行添加凝胶的配方, 琼脂粉添加量一般为7.0-12.0g/L, 植物凝胶添加量一般为2.0-4.0g/L。 3. 含蔗糖的植物组织培养基, 高压灭菌时, 需要注意避免产生糖焦化现象, 以121℃高压灭菌15分钟或115℃高压灭菌20分钟为宜。 4. 含琼脂或植物凝胶的培养基, 高压灭菌前一定要加热煮沸, 搅拌至完全溶解, 煮沸后搅拌时间约1分钟。注意: 切不可省掉加热煮沸搅拌溶解的步骤直接高压灭菌。 5. 添加植物激素, 耐高温的植物激素如IBA、NAA 、6-BA和2,4-D, 可提前加入一起高压灭菌; 对于其他不耐高温的植物激素, 一般需先单独溶解成高倍母液并过滤除菌, 待培养基冷却至65℃左右时加入。 6. 该产品不适宜制备高浓度母液, 会有沉淀产生。 7. 称量时注意粉尘, 佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。 8. 干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖, 避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处。未开封产品保质期三年。开封后根据存放条件的不同, 保质时间存在一定的差异。	
废物处理:	
检测之后带菌物品置于121℃下高压灭菌30分钟后处理。	