



产品使用说明书 Product Manual

1/2B5 培养基（不含琼脂和蔗糖）

品牌	Chinook 钦诺克
货号	CN263536
中文名称	1/2B5 培养基（不含琼脂和蔗糖）
英文名称	1/2 B5 Medium(Without Agar Or Sucrose)
产品别名	1/2B5 培养基(含维生素,不含蔗糖、琼脂)
用途	用于豆科植物以及双子叶、木本植物组织培养
成分 (mg/L) :	
磷酸二氢钠 NaH_2PO_4	75.0
氯化钙 CaCl_2	56.6
硝酸钾 KNO_3	1250.0
硫酸铵 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	67.0
硫酸镁 MgSO_4	61.0
乙二胺四乙酸二钠 Na_2EDTA	37.3
硫酸亚铁 FeSO_4	27.8
硫酸锰 MnSO_4	10.0
硫酸锌 ZnSO_4	2.0
硼酸 H_3BO_3	3.0
钼酸钠 Na_2MoO_4	0.25
硫酸铜 CuSO_4	0.025
氯化钴 CoCl_2	0.025
碘化钾 KI	0.75
盐酸硫胺素 Thiamine HCL	10.0
盐酸吡哆醇 Pyridoxine HCL	1.0
烟酸 Nicotinic Acid	1.0
肌醇 Myo-Inositol	100.0
用法:	
称取本品 1.7g（精确值 1.70275g），加入 1000mL 蒸馏水中溶解，根据实验所需调节 pH 值（一般为 $\text{pH}5.5 \pm 0.2$ ），分装，121°C 高压灭菌 15 分钟。	
注意：如需添加植物激素，耐高温的植物激素如 IBA、NAA、6-BA 和 2,4-D，可提前加	



入一起高压灭菌, 其他不耐高温的植物激素, 需单独溶解并过滤除菌, 待培养基冷却至 65°C 左右时加入。
储存方式:
常温运输, 2-8°C 密封储存; 保质期 3 年。
注意事项:
1. 本品需自行调节 pH 值, 可使用盐酸和氢氧化钠进行调节, 一般调为 $\text{pH}5.5 \pm 0.2 (25^\circ\text{C})$。灭菌后若需微调, 需使用无菌的盐酸溶液和氢氧化钠溶液。 2. 植物组织培养基, 需要自行添加蔗糖的配方, 蔗糖添加量一般为 20.0-30.0g/L; 需自行添加凝胶的配方, 琼脂粉添加量一般为 7.0-12.0g/L, 植物凝胶添加量一般为 2.0-4.0g/L。 3. 含蔗糖的植物组织培养基, 高压灭菌时, 需要注意避免产生糖焦化现象, 以 121°C 高压灭菌 15 分钟或 115°C 高压灭菌 20 分钟为宜。 4. 含琼脂或植物凝胶的培养基, 高压灭菌前一定要加热煮沸, 搅拌至完全溶解, 煮沸后搅拌时间约 1 分钟。注意: 切不可省掉加热煮沸搅拌溶解的步骤直接高压灭菌。 5. 添加植物激素, 耐高温的植物激素如 IBA、NAA、6-BA 和 2,4-D, 可提前加入一起高压灭菌; 对于其他不耐高温的植物激素, 一般需先单独溶解成高倍母液并过滤除菌, 待培养基冷却至 65°C 左右时加入。 6. 该产品不适宜制备高浓度母液, 会有沉淀产生。 7. 称量时注意粉尘, 佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。 8. 干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖, 避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处。未开封产品保质期三年。开封后根据存放条件的不同, 保质时间存在一定的差异。
废物处理:
检测之后带菌物品置于 121°C 下高压灭菌 30 分钟后处理。