



产品使用说明书 Product Manual

GD 培养基基盐/Gresshoff & Doy 培养基基盐 (含维生素)

品牌	Chinook 钦诺克	
货号	CN260602	
中文名称	GD 培养基基盐/Gresshoff & Doy 培养基基盐 (含维生素)	
英文名称	Gresshoff & Doy Base Salts With Vitamins	
产品别名	GD 培养基 (含维生素)	
用途	用于培养单倍体花药和从二倍体花药培养得到的拟南芥单倍体愈伤组织等	
成分 (mg/L) :		
四水硝酸钙 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$		208.81
氯化钾 KCl		65.0
磷酸二氢钾 KH_2PO_4		300.0
硝酸钾 KNO_3		1000.0
硫酸镁 MgSO_4		17.09
硝酸铵 NH_4NO_3		1000.0
六水氯化钴 $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$		0.025
五水硫酸铜 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$		0.025
乙二胺四乙酸铁钠 FeNaEDTA		36.7
硼酸 H_3BO_3		0.3
碘化钾 KI		0.8
一水硫酸锰 $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$		1.0
二水钼酸钠 $\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$		0.025
七水硫酸锌 $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$		0.3
甘氨酸 Glycine		4.0
肌醇 Myo-Inositol		100.0
烟酸 Nicotinic Acid		1.0
盐酸吡哆醇 Pyridoxine HCL		1.0
盐酸硫胺素 Thiamine HCL		10.0
用法:		
称取本品 2.75g (精确值 2.746075g), 加入 1000mL 蒸馏水中溶解, 根据实验所需添加蔗糖和琼脂等成分 (若添加琼脂则需加热煮沸搅拌至溶解), 调节 pH 值 (一般为 pH5.7-5.9), 分装, 121°C 高压灭菌 15 分钟。		



注意：如需添加植物激素，耐高温的植物激素如 IBA、NAA、6-BA 和 2,4-D，可提前加入一起高压灭菌，其他不耐高温的植物激素，需单独溶解并过滤除菌，待培养基冷却至 65°C 左右时加入。

储存方式：

常温运输，2-8°C 密封储存；保质期 3 年。

注意事项：

1. 本品需自行调节 pH 值，可使用盐酸和氢氧化钠调节 pH，一般调为 pH5.7-5.9 (25°C)，具体视实验要求而定。
2. 植物组织培养基，需要自行添加蔗糖的配方，蔗糖添加量一般为 20.0-30.0g/L；需自行添加凝胶的配方，琼脂粉添加量一般为 7.0-12.0g/L，植物凝胶添加量一般为 2.0-4.0g/L。
3. 含蔗糖的植物组织培养基，高压灭菌时，需要注意避免产生糖焦化现象，以 121°C 高压灭菌 15 分钟或 115°C 高压灭菌 20 分钟为宜。
4. 含琼脂或植物凝胶的培养基，高压灭菌前一定要加热煮沸，搅拌至完全溶解，煮沸后搅拌时间约 1 分钟。注意：切不可省掉加热煮沸搅拌溶解的步骤直接高压灭菌。
5. 添加植物激素，耐高温的植物激素如 IBA、NAA、6-BA 和 2,4-D，可提前加入一起高压灭菌；对于其他不耐高温的植物激素，一般需先单独溶解成高倍母液并过滤除菌，待培养基冷却至 65°C 左右时加入。
6. 该产品不适宜制备高浓度母液，会有沉淀产生。
7. 称量时注意粉尘，佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。
8. 干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖，避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处。未开封产品保质期三年。开封后根据存放条件的不同，保质时间存在一定的差异。

废物处理：

检测之后带菌物品置于 121°C 下高压灭菌 30 分钟后处理。