



产品使用说明书 Product Manual

1/2MT 生根培养基（含蔗糖、植物凝胶）（pH5.8±0.2）

品牌	Chinook 钦诺克	
货号	CN260542	
中文名称	1/2MT 生根培养基（含蔗糖、植物凝胶）（pH5.8±0.2）	
英文名称	1/2 MT Rooting Medium(Sucrose And Phytigel)	
产品别名	1/2MT 生根培养基（含维生素、激素、蔗糖、植物凝胶）（pH5.8±0.2）	
用途	用于柑橘属组织培养	
成分（mg/L）：		
硝酸铵 NH ₄ NO ₃	825.0	
氯化钙 CaCl ₂	166.1	
硫酸镁 MgSO ₄	90.35	
硝酸钾 KNO ₃	950.0	
磷酸二氢钾 KH ₂ PO ₄	85.0	
硼酸 H ₃ BO ₃	6.2	
六水氯化钴 CoCl ₂ ·6H ₂ O	0.025	
五水硫酸铜 CuSO ₄ ·5H ₂ O	0.025	
乙二胺四乙酸铁钠 FeNaEDTA	36.7	
一水硫酸锰 MnSO ₄ ·H ₂ O	16.9	
二水钼酸钠 Na ₂ MoO ₄ ·2H ₂ O	0.25	
碘化钾 KI	0.83	
七水硫酸锌 ZnSO ₄ ·7H ₂ O	8.6	
甘氨酸 Glycine	2.0	
肌醇 Inositol	100.0	
烟酸 Nicotinic Acid	5.0	
盐酸吡哆醇 Pyridoxine HCL	10.0	
盐酸硫胺素 Thiamine HCL	10.0	
α-萘乙酸 NAA	0.5	
3-吲哚丁酸 IBA	0.1	
蔗糖 Sucrose	25000.0	
植物凝胶 Phytigel	4000.0	
pH	5.8±0.2（25℃）	

用法：

称取本品 31.31g (精确值 31.31358g)，加入 1000mL 蒸馏水，加热煮沸，搅拌至完全溶解，测试 pH 值，如有必要可微调 pH 值 ($\text{pH}5.8 \pm 0.2$)，分装，121°C 高压灭菌 15 分钟。

注意：如需添加植物激素，耐高温的植物激素如 IBA、NAA、6-BA 和 2,4-D，可提前加入一起高压灭菌，其他不耐高温的植物激素，需单独溶解并过滤除菌，待培养基冷却至 65°C 左右时加入。

储存方式：

常温运输，2-8°C 密封储存；保质期 3 年。

注意事项：

1. 本品 $\text{pH}5.8 \pm 0.2$ (25°C)，配置时可测量 pH 值，如有必要可微调 pH 值。
2. 含蔗糖的植物组织培养基，高压灭菌时，需要注意避免产生糖焦化现象，以 121°C 高压灭菌 15 分钟或 115°C 高压灭菌 20 分钟为宜。
3. 含琼脂或植物凝胶的培养基，高压灭菌前一定要加热煮沸，搅拌至完全溶解，煮沸后搅拌时间约 1 分钟。注意：切不可省掉加热煮沸搅拌溶解的步骤直接高压灭菌。
4. 添加植物激素，耐高温的植物激素如 IBA、NAA、6-BA 和 2,4-D，可提前加入一起高压灭菌；对于其他不耐高温的植物激素，一般需先单独溶解成高倍母液并过滤除菌，待培养基冷却至 65°C 左右时加入。
5. 该产品不适宜制备高浓度母液，会有沉淀产生。
6. 称量时注意粉尘，佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。
7. 干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖，避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处。未开封产品保质期三年。开封后根据存放条件的不同，保质时间存在一定的差异。

废物处理：

检测之后带菌物品置于 121°C 下高压灭菌 30 分钟后处理。