



产品使用说明书 Product Manual

拟南芥生芽培养基（含蔗糖、琼脂、激素）（pH5.8±0.2）

品牌	Chinook 钦诺克
货号	CN260544
中文名称	拟南芥生芽培养基（含蔗糖、琼脂、激素）（pH5.8±0.2）
英文名称	Arabidopsis Thaliana Budding Medium(With Sucrose, Agar And Hormone)
产品别名	拟南芥生芽培养基（含蔗糖、琼脂、激素）
用途	用于拟南芥生芽组织培养
成分（mg/L）：	
硝酸铵 NH_4NO_3	1650.0
氯化钙 CaCl_2	332.2
硫酸镁 MgSO_4	180.7
硝酸钾 KNO_3	1900.0
磷酸二氢钾 KH_2PO_4	170.0
硼酸 H_3BO_3	6.2
六水氯化钴 $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	0.025
五水硫酸铜 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	0.025
乙二胺四乙酸铁钠 FeNaEDTA	36.7
一水硫酸锰 $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	16.9
二水钼酸钠 $\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	0.25
碘化钾 KI	0.83
七水硫酸锌 $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	8.6
肌醇 Myo-Inositol	100.0
烟酸 Nicotinic Acid	1.0
盐酸吡哆醇 Pyridoxine HCL	1.0
盐酸硫胺素 Thiamine HCL	10.0
蔗糖 Sucrose	30000.0
2,4-二氯苯氧乙酸 2,4-D	0.5
6-苄氨基嘌呤 6-BA	0.1
琼脂 Agar	7000.0
pH	5.8±0.2 (25°C)



用法：

称取本品 41.42g (精确值 41.41503g)，加入 1000mL 蒸馏水，加热煮沸，搅拌至完全溶解，分装，121℃ 高压灭菌 15 分钟。

注意：如需添加植物激素，耐高温的植物激素如 IBA、NAA、6-BA 和 2,4-D，可提前加入一起高压灭菌，其他不耐高温的植物激素，需单独溶解并过滤除菌，待培养基冷却至 65℃ 左右时加入。

储存方式：

常温运输，2-8℃ 密封储存；保质期 3 年。

注意事项：

1. 本品 pH5.8±0.2，灭菌后若需微调，需使用无菌的盐酸溶液和氢氧化钠溶液进行调节。
2. 含蔗糖的植物组织培养基，高压灭菌时，需要注意避免产生糖焦化现象，以 121℃ 高压灭菌 15 分钟或 115℃ 高压灭菌 20 分钟为宜。
3. 含琼脂或植物凝胶的培养基，高压灭菌前一定要加热煮沸，搅拌至完全溶解，煮沸后搅拌时间约 1 分钟。注意：切不可省掉加热煮沸搅拌溶解的步骤直接高压灭菌。
4. 添加植物激素，耐高温的植物激素如 IBA、NAA、6-BA 和 2,4-D，可提前加入一起高压灭菌；对于其他不耐高温的植物激素，一般需先单独溶解成高倍母液并过滤除菌，待培养基冷却至 65℃ 左右时加入。
5. 称量时注意粉尘，佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。
6. 干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖，避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处。未开封产品保质期三年。开封后根据存放条件的不同，保质时间存在一定的差异。

废物处理：

检测之后带菌物品置于 121℃ 下高压灭菌 30 分钟后处理。